

แบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาพ่น Spiriva® handihaler (Tiotropium)

ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อ-สกุล..... HN..... อายุ..... ปี

COPD Gold

ยาพ่นควบคุมอาการ (Controller) ปัจจุบัน

Seretide® MDI วิธีใช้.....

Seretide® Accuhaler วิธีใช้.....

เกณฑ์การเริ่มยา Spiriva®

ใช่ ไม่ใช่

1. มีหลักฐานการเป็น COPD ได้แก่ เคยทำ PFT และเข้ากันได้กับ COPD อย่างน้อย 1 ครั้ง

2. เกิด exacerbation ≥ 2 ครั้ง หรือมี admit visit ≥ 1 ครั้ง ใน 1 ปี ที่ผ่านมา

3. visit นี้ mMRC ≥ 2 หรือ CAT ≥ 10

4. เทคนิคการพ่นยาถูกต้อง และความร่วมมือในการใช้ยาพ่นสม่ำเสมอ

หมายเหตุ

ต้องเข้าเกณฑ์ (ใช่) ข้อ 1,2,4 หรือ 1,3,4

แพทย์ผู้สั่งใช้.....อายุรแพทย์.....